



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ В ДОУ

Первая помощь при отравлении парами ртути

- ✓ Вызовите бригаду скорой медицинской помощи. В детском саду, скорее всего, нет специальных препаратов, с помощью которых можно нейтрализовать вредное действие токсинов при отравлении ртутью.
- ✓ Выведите пострадавшего на свежий воздух.
- ✓ После вдыхания паров ртути нужно обязательно очистить желудок (подойдет вода с добавлением яичного белка или любое слабительное).
- ✓ Пострадавший должен выпить положенное по массе тела количество таблеток активированного угля.
- ✓ Давайте как можно больше пить: воды, молока, чая. Чем больше количество жидкости, тем быстрее из организма выводятся соединения ртути.
- ✓ Уложите пострадавшего, повернув его голову на бок. В противном случае, если человек потеряет сознание, он может захлебнуться рвотными массами. Следите, чтобы дыхательные пути были свободны.

Симптомы острого отравления парами ртути:

- ✓ поражение дыхательных путей (озноб, резкий сухой кашель, насморк, одышка, возможен токсический отек легких);
- ✓ частый жидкий стул;
- ✓ возбуждение или сонливость.